



**Vlaanderen**  
verbeelding werkt

# WILDE LIGUSTER (*Ligustrum vulgare*)

OOK: Gewone liguster

## **BASISEIGENSCHAPPEN**

### **STANDPLAATS**

- De gewone liguster is een schaduwboomsoort.
- Wij vinden hem langs bosranden en struwelen en vaak in hagen.
- Gewone liguster kan ook voorkomen als solitaire plant.

### **BODEMSOORT**

- De gewone liguster stelt weinig eisen, maar verkiest kalkrijke grond.
- In kustduinen en de krijtgebieden van Zuid-Limburg en Voeren is de plant karakteristiek.

## **ECOSYSTEEMDIENSTEN**

### **REGULEREND**

#### **Bestuiving**

- De tweedelige stempel staat aan de ingang van de bloemkroonbuis. De twee meeldraden steken eruit. De sterk ruikende bloemen zijn homogam.
- De stand van de helmknopjes ten opzichte van de stempel is verschillend. Soms staan ze wijd uiteen. Dan kan een bezoekend insect met de ene zijde van zijn slurf een helmknopje en met de andere de stempel aanraken. Zo bewerkt het diertje kruisbestuiving. In andere gevallen neigen ze over de stempel, zodat er ook spontaan zelfbestuiving kan optreden.

### **ONDERSTEUNEND**

#### **Bodemvorming**

- De soort kent een snelle bladvertering.



**Vlaanderen**  
verbeelding werkt

### **Kringloop van voedingsstoffen**

- De insecten vinden honing in de bloemen, die de wand van het vruchtbeginsel afscheidt.
- Vogels eten de vlezige vruchten. Zo geraken de zaden verspreid.

## **CULTUREEL**

### **Spirituele en culturele waarden**

- Volgens sommigen komt de naam van het Latijnse ligare, binden. Het zou erop slaan dat de buigzame takken dienden om er snoeren van te maken.
- Volgens anderen van het Latijnse ligurio, snoepen, omdat de bladen een lepelvormige gedaante hebben.
- Naast de meest algemene benaming liguster, zijn er ook regio's waar de termen heeg, kattenkruid, heggensering, haagjes en wilde sering courant zijn.

## **PRODUCEREND**

### **Voedsel**

- De wilde liguster is een waardplant voor heel wat soorten microvlinders, waaronder grauwe steltmot, seringensteltmot, blauw smalsnuitje, azuurbladroller, winterbladroller, zilvertlekbladroller, heggenbladroller, anjermot, tuinbladroller, vruchtbladroller, fijngestreepte haakbladroller, gewone coronamot en satijnlichtmot.
- Ook bijen laten zich aantrekken door deze struik.
- Voor de mensen zijn de zwarte besjes giftig, maar vogels lusten ze wel.

### **Grondstoffen**

- De Vlaamse dialectbenamingen wanore, reinwisse of reinwilg geven aan dat de wilde liguster in het verleden als vlechtmateriaal diende.



**Vlaanderen**  
verbeelding werkt





**Vlaanderen**  
verbeelding werkt

## Bronnen

- Diez, Otmar. Eetbare bomen en struiken. Uitg. Noordboek, 2020.
- Hecker, Katrin. Bomen. (ANWB Basis Natuurgidsen). Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2022.
- Maes, Bert (red.). Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Bert Maes, Utrecht, 2013.
- van den Bremer, Arie. Basisgids bomen en struiken. KNNV Uitgeverij, Zeist, 2020.
- [https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde\\_liguster](https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_liguster)
- <https://www.willaert.be/nl/plant/LIGUSTRUM++VULGARE+'ATROVIRENS'/livatrov>
- <https://waarnemingen.be/species/6984/>
- <https://www.ecopedia.be/boom/wilde-liguster>
- <https://bomenwijzer.be/boom/125>